

Жовто-бурий мармуровий клоп: загроза для врожаю та рослинництва

Жовто-бурий мармуровий клоп (*Halyomorpha halys* Stal) – небезпечний поліфаг, що становить значну загрозу для аграрного сектору України. Завдяки широкому колу рослин-господарів та здатності швидко розмножуватись, він здатен спричинити істотні економічні збитки.

Клоп пошкоджує понад 100 видів культурних і дикорослих рослин, зокрема:

- **Плодові культури:** яблуна, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, персик, хурма, цитрусові;
- **Ягідні культури:** виноград, малина, шовковиця, шипшина;
- **Горіхоплідні:** ліщина (фундук);
- **Овочеві:** огірок, томат, перець, баклажан, бамія, квасоля;
- **Сільськогосподарські культури:** соя, кукурудза, пшениця, ячмінь, боби, горох, нут, спаржа;
- **Лісові та декоративні насадження:** листяні дерева й чагарники.



Симптоми ураження рослин залежать від виду культури:

- **Плодові дерева:** некротичні ділянки на листі та плодах, знебарвлення та/або деформація плодів, погіршення смаку;
- **Виноград:** опадання та недорозвиненість ягід;
- **Фундук:** зупинка розвитку ядра через пошкодження в період молочно-воскової стиглості;
- **Овочі:** білі губчасті або голчасті ділянки тканини під шкіркою;
- **Соя:** пунктирні темні плями, деформоване насіння та стручки, знижена схожість;
- **Кукурудза:** пригнічений ріст, знебарвлення та висихання зерен, неповне запилення.

Жовто-бурий мармуровий клоп **може потрапити** на територію України або **поширюватися** в межах країни такими шляхами:

- разом із **транспортними засобами**, сільськогосподарською технікою та обладнанням;
- у **пакувальних матеріалах** – дерев'яна тара, контейнери, ящики для збору та зберігання плодів;
- із **садивним матеріалом**, зрізаними квітами та гілками, свіжими овочами і фруктами з регіонів розповсюдження шкідника;
- з **іншими рослинами** та об'єктами рослинного походження.

Для виявлення жовто-бурого мармурового клопа використовуються феромонні пастки (травень-жовтень). У промислових господарствах рекомендовано 1 пастку на гектар, у приватному секторі — 1 пастку на сад чи ділянку.

Візуальні обстеження рекомендується проводити у три ключові періоди:

- під час весняної активності шкідника (травень);
- у період пікового розвитку популяції (липень–серпень);
- у фазу пошуку місць для зимівлі (вересень–листопад).

Заходи боротьби

- Механічний метод — збір комах (згрібання, змітання) у місцях зимівлі з подальшим знищенням.
- Хімічний метод — застосування дозволених в Україні препаратів (піретроїди, фосфорорганічні, неонікотинноїди) з урахуванням фаз розвитку популяції шкідника.

Злагоджені дії аграріїв та фітосанітарних фахівців є ключовими у стримуванні поширення цього небезпечного карантинного шкідника.

У разі виявлення підозрілих комах або характерних ознак пошкодження рослин, громадян та аграріїв просимо негайно звертатися до Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Своєчасне виявлення та локалізація вогнищ є ключовими факторами для запобігання поширенню шкідника та збереження врожаю.

Спільно з європейським проєктом EU4SaferFood створили інформаційні матеріали щодо ознак, заходів боротьби та шляхів поширення жовто-бурого мармурового клопа.



Карантинні організми
Поширення на території України




дізнатися більше

ЖОВТО-БУРИЙ МАРМУРОВИЙ КЛОП

(*Halyomorpha halys* Stal.)


є шкідником більш ніж 100 видів рослин



ЯГІДНІ

виноград,
шовковиця,
шипшина,
малина тощо

зупинка розвитку та обпадання ягід



СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ



У разі виявлення
будь-яких карантинних організмів
зверніться до територіального підрозділу
Держпродспоживслужби у вашій області



Фінансується
Європейським Союзом



ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

Публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу



Карантинні організми
Поширення на території України



Дізнатися більше

ЖОВТО-БУРИЙ МАРМУРОВИЙ КЛОП

(*Halyomorpha halys* Stal.)

є шкідником більш ніж 100 видів рослин



транспортні
засоби




ШЛЯХИ
ПОШИРЕННЯ

ящики для збору
та пакування плодів

контейнери для
транспортування

ін. матеріали



матеріали
та обладнання



свіжі
овочі/фрукти

садовий
матеріал

зрізи
квітів/гілок


рослини

з територій
розповсюдження



У разі виявлення
будь-яких карантинних організмів
зверніться до територіального підрозділу
Держпродспоживслужби у вашій області

МЕТОДИ
ВІЯВЛЕННЯ



візуально
під час:

весняної появи
травень

пікового зростання популяції
липень - серпень


пошуку місця для зимівлі
кінець вересня - листопад

феромонні пастки
травень - жовтень

промислові сади та поля
1 пастка на 1 га

приватний сектор
1 пастка на 1 сад

чи присадибну ділянку



Фінансується
Європейським Союзом



ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

Публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу



Карантинні організми
Поширення на території України



дізнатися більше

ЖОВТО-БУРИЙ МАРМУРОВИЙ КЛОП

(*Halyomorpha halys* Stal.)

є шкідником **більш ніж 100 видів рослин**



згрібання,
змітання

механічний

збір та знищення
клопів
у місцях зимівлі




У разі виявлення
будь-яких карантинних організмів
зверніться до територіального підрозділу
Держпродспоживслужби у вашій області

**МЕТОДИ
БОРотьБИ**

хімічний

**єдиний
ефективний
спосіб**



перша обробка
дорослої особини
у період зимівлі

у вечірні години,
коли різко
знижується льотна
активність клопів

подальші обробки

у разі високої чисельності
наступних поколінь

друга обробка

період масового відродження з яєць
личинок першого покоління

**або дві
повторні третя обробка**

період появи личинок
другого покоління

за
необхідності

на основі
імідаклоприду,
ацетаміприду,
тіаклоприду,
тіаметоксиду

ефективні
препарати груп

- піретроїдна
- фосфорорганічна
- неонікотіноїдна



лише внесені до переліку
пестицидів і агрохімікатів,
дозволених до використання в Україні



Фінансується
Європейським Союзом



ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

Публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу